

## Lösung Hepatitis

K25

<b>25</b>	Terminvereinbarung telefonisch	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melden am Telefon (Begrüßung, Praxis, eigener Name)</li><li>- <b>ggf.</b> Grund des Praxisbesuchs eruieren</li><li>- <b>ggf.</b> Dringlichkeit abklären</li><li>- <b>ggf.</b> nüchtern (Termin morgens)</li><li>- Termin vereinbaren, ggf. kurzfristig</li></ul>
-----------	--------------------------------	--

K01

<b>01</b>	Patientenempfang (zum vereinbarten Termin)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Begrüßung (eigene Vorstellung bei neuen Patienten)</li><li>- korrekte, dem Alter entsprechende Ansprache</li><li>- Grund des Praxisbesuchs ansprechen</li><li>- nächsten Schritt einleiten (z. B. in Wartezone schicken, Notfall erkennen)</li></ul>
-----------	---	--

V41c

<b>41c</b>	Patientenaufnahme (unbekannter Patient im Vertretungsfall)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Datenschutzerklärung</b></li><li>- Versichertenkarte einlesen</li></ul>
------------	--	--

V43h

<b>43h</b>	Formular – Notfall- oder Vertretungsschein (Muster 19)	<ul style="list-style-type: none"><li>- ankreuzen: Notfalldienst od. Vertretung od. Notfall</li><li>- Quartal</li><li>- Geschlecht</li><li>- Diagnose(n)</li><li>- Befund(e)</li><li>- Therapie</li><li>- arbeitsunfähig bis ...</li><li>- weiterbehandelnder Arzt</li><li>- Unterschrift des Patienten</li></ul>
------------	--	---

162

<b>162</b>	Temperaturmessung im Ohr	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elektronisches Thermometer auf Funktionsfähigkeit überprüfen u. auf null stellen</li><li>- in beiden Ohren messen</li><li>- Mittelwert als Ergebnis</li><li>- nach der Messung Trichter desinfizieren oder Einmalartikel</li></ul>
------------	--------------------------	--

102

102	Blutdruckmessung bei einem neuen Patienten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patient muss 3-5 min am Platz sitzen</li> <li>- Arm auflegen</li> <li>- luftleere Manschette in passender Breite (ca. 40% des Oberarmumfangs oder Tab. benutzen)</li> <li>- fest um den unbedeckten Oberarm (2 Finger dürfen zwischen Arm und Manschette passen)</li> <li>- Kennzeichnung der Manschette (wenn vorhanden) richtig platzieren</li> <li>- ca. 2,5 cm oberhalb der Ellenbeuge in Herzhöhe legen</li> <li>- Radialispuls aufsuchen (evtl. auch Brachialispuls in der Ellenbeuge)</li> <li>- zügig aufpumpen bis 30 mmHg über Verschwinden des Radialispulses</li> <li>- Stethoskop an der ulnaren Seite der Ellenbeuge anlegen</li> <li>- Luft langsam (2-3 mm Hg/s) ablassen</li> <li>- am 2. Arm adäquat verfahren</li> <li>- systolischen u. diastolischen Wert dokumentieren</li> </ul> <p><b>(bei falschem Wert maximal halbe Punktzahl)</b></p>
-----	--	--

504

504	Demonstration einer hygienischen Händedesinfektion <b>(bei Fehler mind. 2 Punkte Abzug bis 0P)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schmuck entfernen, kein Nagellack und künstliche Fingernägel</li> <li>- Desinfektionsmittel einem Wandspender durch Druck mit Ellenbogen entnehmen</li> <li>- Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten, z. B. trockene Hände 30 s mit Händedesinfektionsmittel einreiben, dabei Daumen, Zwischenfingerräume, Nagelbetten, Fingerkuppen, Handfläche und Handgelenk nicht vergessen</li> <li>- lufttrocknen lassen</li> </ul>
-----	---	---

106

106	i.v. – Blutentnahme <b>(Flächendesinfektion bereits erfolgt)</b> <b>Bei Auswahl eines falschen Röhrchens 2P Abzug</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- keimarme Handschuhe anziehen (sofort nach Desinfektion)</li> <li>- Pat. sitzt oder liegt</li> <li>- Arm auf Polster lagern</li> <li>- Stauschlauch anlegen</li> <li>- fachgerechtes Stauen (Radialispuls tastbar)</li> <li>- Vene palpieren</li> <li>- desinfizieren, Einwirkdauer bis trocken</li> <li>- beim Einstich Anschliff nach oben</li> <li>- Stauung lösen, sobald Blut fließt</li> <li>- richtiges Röhrchen verwenden, Röhrcheninhalt durch Schwenken mischen (Nativröhrchen immer vor Röhrchen mit Additiva abnehmen)</li> <li>- Kanüle entfernen</li> <li>- Patienten auffordern, mit keimarmem Tupfer einige Minuten Druck auszuüben</li> </ul>
-----	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kanüle fachgerecht entsorgen (Kanülenbox)</li> <li>- Pflaster aufkleben (Pflasterallergie?)</li> </ul>
--	--	---

515

<b>515</b>	Verletzung mit benutzter Kanüle oder Schnittverletzung (Blut der verletzten Person u. Blut des Patienten - Einverständnis des Patienten für Antikörperbestimmung sichern) <b>(b. Fehler in d. Durchführung Punktabzug bis OP)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blutung fördern, mindestens 1 Minute</li> <li>- Desinfektion durch Eintauchen (Finger oder Hand) in Wunddesinfektionsmittel oder 10 Minuten mit stets feuchtem, desinfektionsmittelgetränktem Tupfer</li> <li>- Arzt benachrichtigen</li> <li>- Verband</li> <li>- Dokumentation des Vorgangs (Verbandbuch) u. der Patientendaten für BG-Meldung an Arbeitgeber            (- Arzt veranlasst je nach Immunitätslage von MFA und Pat.: Blutuntersuchungen auf Anti-HBs, Anti-HBc, Anti- HCV, Anti-HIV, ggf. Medikamenteneinnahme)</li> </ul>
------------	--	---

828

<b>828</b>	Blutversand mit Laborüberweisung an Facharztlabor (Muster 10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kurativ/präventiv</li> <li>- Geschlecht</li> <li>- Verdachtsdiagnose</li> <li>- Barcode</li> <li>- Abnahmedatum, -zeit</li> <li>- Auftrag</li> <li>- ggf. Kennziffer</li> <li>- ggf. Unfallfolgen</li> <li>- ggf. Vorbefund</li> <li>- Eintrag ins Laborbuch</li> <li>- Handschuhe anziehen</li> <li>- Material bruch- und auslaufsicher verpacken bzw. bereitstellen</li> </ul>
------------	---	---

880

<b>880</b>	CRP – Schnell-Test <b>Durchführung erklären</b> Alternativ kann auch der qualitative Latextest oder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verfallsdatum überprüfen</li> <li>- Handschuhe anziehen</li> <li>- Reagenzien und Proben auf Raumtemperatur bringen</li> <li>- Arbeitsanleitung beachten! z.B. Kassettest</li> </ul>
------------	---	---

	der semiquantitative CRPTest erklärt werden <b>Gleiche Punktzahl!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10-12 Tropfen Pufferlösung in Mischröhrchen geben (senkrecht halten)</li> <li>- 10 µl Vollblut in Pufferlösung geben (alternativ 3,5 µl Serum oder Plasma)</li> <li>- Tropfkappe aufsetzen</li> <li>- Tropfenzahl nach Anleitung aus dem Röhrchen auf das Probenfeld geben</li> <li>- nach 5 min ablesen (7 min nicht überschreiten)</li> <li>- Ergebnis dokumentieren <b>maximal halbe Punktzahl</b></li> </ul>
--	--	---

890

<b>890</b>	Aufräumen des Arbeitsplatzes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ggf. Kanülen oder Lanzetten in Abwurfbehälter entsorgen</li> <li>- kontaminiertes Material nach LAGA – Richtlinien entsorgen</li> <li>- Zurückstellen verwendeter Gegenstände</li> <li>- Flächendesinfektion</li> </ul>
------------	------------------------------	--

V43b

<b>43b</b>	Formular - Verordnung von Krankenhausbehandlung (Muster 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ankreuzen: Belegarzt od. Notfall od. Unfall od. Versorgungsleiden od. kein Ankreuzen</li> <li>- nächstes erreichbares geeignetes Krankenhaus</li> <li>- Diagnose</li> <li>- Untersuchungsergebnis(se)</li> <li>- bisherige Maßnahme(n)</li> <li>- ggf. Hinweise (z. B. Allergie), mitgegebene Befunde</li> </ul>
------------	--	---

V43a

<b>43a</b>	Formular - Verordnung einer Krankenförderung bereitlegen (Muster 4)	- Formular bereitlegen
------------	---	------------------------

K26

<b>26</b>	Krankenwagenbestellung telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melden am Telefon (Begrüßung, Praxis, eigener Name)</li> <li>- Grund des Anrufs mit Verdachtsdiagnose</li> <li>- Praxisadresse (bei Hausbesuch Patientenanschrift mit evtl. Besonderheiten)</li> <li>- Dringlichkeit</li> <li>- Einweisung (Muster 4) mitgeben</li> </ul>
-----------	------------------------------------	--

K38

<b>38</b>	Verabschiedung verunsicherter Patient (positiv/negativ)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Empathie zeigen (ansprechen, kümmern, Hilfe anbieten, Zeit nehmen, etc.)</li><li>- ist der Patient mit allem versorgt?</li><li>- hat der Patient alle Informationen? (z. B. neuer Termin)</li><li>- Genesungswünsche (Glückwünsche, z. B. Schwangerschaft)</li><li>- Gruß</li></ul>
-----------	--	---

751

<b>751</b>	Dokumentation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Datum</li><li>- Diagnosen</li><li>- Untersuchungen mit Ergebnis</li><li>- therapeutische Maßnahmen</li><li>- ausgestellte Formulare</li><li>- Sonstiges</li></ul> Punktzahl fallabhängig
------------	---------------	--

750

<b>750</b>	Abrechnung	Falsche Ziffern ergeben keinen Punkt, zusätzliche Ziffern je ein P Abzug bis minimal 0P pro Tag
------------	------------	---