

Lösung v.-a. Eileiterschwangerschaft

K02:

Patientenempfang (ohne Termin)	<ul style="list-style-type: none">- Begrüßung (eigene Vorstellung bei neuen Patienten)- korrekte, dem Alter entsprechende Ansprache- Grund des Praxisbesuchs eruieren, auf Situation eingehen- Problem Terminvergabe lösen (z. B. längere Wartezeit)- nächsten Schritt einleiten (z. B. in Wartezone schicken)
--------------------------------	--

V41a:

Patientenaufnahme (bekannter Patient)	<ul style="list-style-type: none">- Versichertenkarte einlesen- Karteikarte bereitlegen
---------------------------------------	--

336:

PECH-Regel	<ul style="list-style-type: none">- Pause- Eis (Kühlpack)- Compression- Hochlagern
------------	---

150:

Sonografie vorbereiten	<ul style="list-style-type: none">- Patienten mit Namen (ohne Untersuchungsart zu nennen) aufrufen- Raum (evtl. abdunkeln), Liege und Gerät vorbereiten- Kontaktgel- Zellstoff zum Entfernen des Gels
------------------------	--

504:

Demonstration einer hygienischen Händedesinfektion (bei Fehler mind. 2 Punkte Abzug bis 0P)	<ul style="list-style-type: none">- Schmuck entfernen, kein Nagellack und künstliche Fingernägel- Desinfektionsmittel einem Wandspender durch Druck mit Ellenbogen entnehmen- Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten, z. B. trockene Hände 30 s mit Händedesinfektionsmittel einreiben, dabei Daumen, Zwischenfingerräume, Nagelbette, Fingerkuppen, Handflächen und Handgelenke nicht vergessen- lufttrocknen lassen
---	---

330:

Ellenbogenverband zur Ruhigstellung nach Kontusion anlegen	<ul style="list-style-type: none">- geeignete Binde und Bindenbreite auswählen- Rollenpflaster zur Bindenbefestigung- Gelenk in Funktionsstellung- richtige Bindenführung (Schildkrötenverband)
--	--

331:

Wundabdeckung mit Pflaster vornehmen (Händedesinfektion eigener Baustein)	<ul style="list-style-type: none">- keimarme Handschuhe- ggf. Wunddesinfektion- Abklärung von Pflasterallergie- Auswahl der richtigen Pflasterbreite- Abziehen der beidseitigen Abdeckungen erst beim Anlegen- Sitz des Pflasters (Spannung)
---	---

811:

Schwangerschaftstest (Teststreifen)	<ul style="list-style-type: none">- Verfallsdatum überprüfen- Handschuhe- Dose öffnen, Teststreifen richtig (Streifen nach vorn gleiten lassen) entnehmen und Dose verschließen- Teststreifen bis zur Markierung (nach Arbeitsanleitung) kurz in Urinprobe (Morgenurin) eintauchen- Teststreifen auf eine saubere, ebene Fläche legen und warten, bis rote Linie(n) erscheinen- Ergebnis nach 3 min ablesen
-------------------------------------	--

807:

Urinuntersuchung mit Teststreifen (mindestens 5 der folgenden Parameter: Eiweiß, Glucose, Ery, Leukos, Nitrit, pH-Wert, Keton, spezifisches Gewicht)	<ul style="list-style-type: none">- Verfallsdatum überprüfen- Handschuhe anziehen- Dose öffnen und Teststreifen richtig entnehmen (Dose kippen, so dass Streifen nach vorn rutschen), Dose sofort wieder schließen- Harn aufschütteln- kurz so eintauchen, dass alle Teststreifenfelder bedeckt sind- seitliche Kante abstreifen am Becherrand- Ablesezeit einhalten (Stoppuhr)- Dokumentation
--	---

890:

Aufräumen des Arbeitsplatzes	<ul style="list-style-type: none">- ggf. Kanülen oder Lanzetten in Abwurfbehälter entsorgen- kontaminiertes Material nach LAGA – Richtlinien entsorgen- Zurückstellen verwendeter Gegenstände- Flächendesinfektion
------------------------------	---

106:

i.v. – Blutentnahme (Flächendesinfektion bereits erfolgt) Bei Auswahl eines falschen Röhrchens 2P Abzug	<ul style="list-style-type: none">- keimarme Handschuhe anziehen (sofort nach Desinfektion)- Pat. sitzt oder liegt- Arm auf Polster lagern- Stauschlauch anlegen- fachgerechtes Stauen (Radialispuls tastbar)- Vene palpieren- desinfizieren, Einwirkdauer bis trocken- beim Einstich Anschliff nach oben- Stauung lösen, sobald Blut fließt- richtiges Röhrchen verwenden, Röhrcheninhalt durch Schwenken mischen (Nativröhrchen immer vor Röhrchen mit Additiva abnehmen)- Kanüle entfernen- Patienten auffordern, mit keimarmem Tupfer einige Minuten Druck auszuüben- Kanüle fachgerecht entsorgen (Kanülenbox)- Pflaster aufkleben (Pflasterallergie?)
---	--

829:

Blutversand mit Laborüberweisung Laborgemeinschaft (Muster 10A)	<ul style="list-style-type: none">- kurativ/präventiv- Geschlecht- Diagnose- Barcode- Abnahmedatum- Abnahmezeit- Auftrag/Aufträge codieren- ggf. Unfallfolgen- ggf. „Befund eilt“- Eintrag ins Laborbuch- Handschuhe anziehen- Material bruch- und auslaufsicher verpacken bzw. bereitstellen
---	---

V43g:

Formular – Überweisungsschein (Muster 6)	<ul style="list-style-type: none">- ankreuzen: kurativ oder präventiv- Quartal- Geschlecht- Überweisung an- Art der Überweisung- Auftrag oder (Verdachts-)Diagnose
---	--

K37:

Verabschiedung Patient	<ul style="list-style-type: none">- ist der Patient mit allem versorgt?- hat er/sie alle Informationen? (z. B. neuer Termin)- Genesungswünsche- Gruß
------------------------	---

751:

Dokumentation	<ul style="list-style-type: none">- Datum- Diagnosen- Untersuchungen mit Ergebnis- therapeutische Maßnahmen- ausgestellte Formulare- Sonstiges Punktzahl fallabhängig
---------------	--

750:

Abrechnung	Falsche Ziffern ergeben keinen Punkt, zusätzliche Ziffern je ein P Abzug bis minimal 0P pro Tag
------------	---

K29:

Schweigepflicht (Anruf eines Dritten, z. B. Ehemann/- frau)	<ul style="list-style-type: none">- Melden am Telefon (Begrüßung, Praxis, eigener Name)- Grund des Anrufs eruieren- auf Schweigepflicht hinweisen (bei Schweigepflichtsverletzung 0 Punkte)
---	---

V43m:

Formular Sprechstundenbedarf	<ul style="list-style-type: none">- BSNR, LANR, Kostenträger, AOK- Datum, Stempel auf Rückseite- Unterschrift Arzt- Bei Impfstoff ,8‘ überschreiben- Anforderungen
------------------------------	--