

Lösung Wundversorgung

851

851	Qualitätssicherung des Blutzuckermessgerätes nach RiliBäk Demonstrieren!	<ul style="list-style-type: none">- Verfallsdatum überprüfen- Dose öffnen und Teststreifen richtig aus der Dose entnehmen (durch Kippen der Dose Teststreifen nach vorn gleiten lassen)- Dose wieder verschließen- Teststreifen in Pfeilrichtung in das Messgerät einführen (Gerät schaltet sich ein)- ggf. Codenummer überprüfen- Kontrolllösungsflasche öffnen (Schraubverschluss)- Spitze der Kontrolllösungsflasche mit Papiertuch abwischen- einen kleinen Tropfen aus der Flasche drücken- Tropfen mit dem vorderen Rand des Messstreifens berühren- vom Messfeld des Teststreifens aufsaugen lassen- Spitze der Flasche mit einem Papiertuch abwischen- Flasche verschließen- Ergebnis auf dem Display ablesen- Ergebnis muss im angegebenen Kontrollbereich liegen- Teststreifen entfernen und entsorgen- auf Dokumentationsbogen „Qualitätssicherung in der patientennahen Sofortdiagnostik“ Dokumentieren
------------	--	--

890

890	Aufräumen des Arbeitsplatzes	<ul style="list-style-type: none">- ggf. Kanülen oder Lanzetten in Abwurfbehälter entsorgen- kontaminiertes Material nach LAGA – Richtlinien entsorgen- Zurückstellen verwendeter Gegenstände- Flächendesinfektion
------------	------------------------------	---

504

504	Demonstration einer hygienischen Händedesinfektion (bei Fehler mind. 2 Punkte Abzug bis 0P)	<ul style="list-style-type: none">- Schmuck entfernen, kein Nagellack und künstliche Fingernägel- Desinfektionsmittel einem Wandspender durch Druck mit Ellenbogen entnehmen- Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten, z. B. trockene Hände 30 s mit Händedesinfektionsmittel einreiben, dabei Daumen, Zwischenfingerräume, Nagelbette, Fingerkuppen, Handflächen und Handgelenke nicht vergessen- lufttrocknen lassen
------------	---	---

101

101	Blutdruckmessung	<ul style="list-style-type: none"> - Patient muss 3-5 min am Platz sitzen - Arm auflegen - luftleere Manschette in passender Breite (ca.40% des Oberarmumfangs oder Tabelle benutzen) - fest um den unbedeckten Oberarm (2 Finger dürfen zw. Arm u. Manschette passen) legen - Kennzeichnung der Manschette (wenn vorhanden) richtig platzieren - ca. 2,5 cm oberhalb der Ellenbeuge in Herzhöhe legen - Radialispuls aufsuchen (evtl. auch Brachialispuls in der Ellenbeuge) - zügig aufpumpen bis 30 mm Hg über Verschwinden des Radialispulses - Stethoskop an der ulnaren Seite der Ellenbeuge anlegen - Luft langsam (2-3 mm Hg/s) ablassen - systolischen und diastolischen Wert dokumentieren (bei falschem Wert maximal halbe Punktzahl)
------------	------------------	---

143

143	Pulsmessung	<ul style="list-style-type: none"> - Auffinden an der Radialseite des Handgelenks - Tasten mit 2., 3. und 4. Finger, nicht Daumen - 15s zählen, Ergebnis mit 4 multiplizieren Alternative: 1 min zählen
------------	-------------	---

140

140	Messen der Körpergröße	- ohne Schuhe, aufrecht stehen, Kopfrand (nicht Frisur) messen
------------	------------------------	--

170

170	Wiegen	<ul style="list-style-type: none"> - ohne Schuhe, leicht bekleidet - Nullpunkt einstellen
------------	--------	---

K25

K25	Terminvereinbarung telefonisch	<ul style="list-style-type: none"> - Melden am Telefon (Begrüßung, Praxis, eigener Name) - ggf. Grund des Praxisbesuchs eruieren - ggf. Dringlichkeit abklären - ggf. nüchtern (Termin morgens) - Termin vereinbaren, ggf. kurzfristig
------------	--------------------------------	---

K01

K01	Patientenempfang (zum vereinbarten Termin)	<ul style="list-style-type: none"> - Begrüßung (eigene Vorstellung bei neuen Patienten) - korrekte, dem Alter entsprechende Ansprache - Grund des Praxisbesuchs ansprechen - nächsten Schritt einleiten (z. B. in Wartezone schicken, Notfall erkennen)
------------	---	---

V41a

V41a	Patientenaufnahme (bekannter Patient)	<ul style="list-style-type: none"> - Versichertenkarte einlesen - Karteikarte bereitlegen
-------------	---------------------------------------	---

K23

K23	Kommunikation (Kind auf Eingriff vorbereiten)	<ul style="list-style-type: none"> - auf die Ebene des Kindes begeben (z. B. hinhocken) - kindgerechte Sprache - wahrheitsgemäß auf Eingriff vorbereiten (Schmerzen nicht verleugnen, Mut zusprechen) - Belohnung in Aussicht stellen
------------	---	---

310

310	<p>Wundversorgung (verunreinigte, klaffende Wunde, unbehaart) vorbereiten</p> <p>(Händedesinfektion eigener Baustein)</p> <p>(Arbeitsplatz ist desinfiziert)</p> <p>Fehlerhaftes steriles Aufdecken: Abzug bis zu 2 Punkten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wunddesinfektionsmittel - Wundreinigungsmittel, z.B. Ringerlösung (nur bei verunreinigter Wunde) - Anästhesie (Ampulle mit Lokalanästhetikum, 2 geeignete Kanülen, Spritze) - Pulsoxymeter - sterile Handschuhe - Steriles Abdecktuch für Arbeitsfläche, einmal Aufdecken demonstrieren - sterile Tupfer und Kompressen, antiadhäsive Wundauflage - 2 Nierenschalen (eine für Abfall, eine für zu sterilisierende Instrumente) - sterile Gefäßklemme (bereithalten) - steriles geballtes/bauchiges Skalpell - sterile chirurgische, anatomische und Splitter-Pinzette - sterile Naht (Nadel mit Nahtmaterial, Nadelhalter) - sterile Schere (zum Fadenabschneiden) - Abdecktuch für den Behandlungsplatz - Abdecktuch Patienten (steriles Lochtuch)
------------	---	---

300

300	<p>Anziehen von sterilen Handschuhen</p> <p>(Händedesinfektion bereits erfolgt) (AF ist desinfiziert)</p>	<p>Öffnen der äußeren Verpackung durch Assistenz, bei der inneren Verpackung nur die Umschlagkante berühren, auseinanderfalten. Ersten Handschuh nur an der Kante der Umschlagfalte anfassen und anziehen. Für den zweiten Handschuh mit der ersten Hand in die Umschlagfalte greifen und den zweiten Handschuh anziehen.</p> <p>Hinweis: Die behandschuhten Hände dürfen nur sterile Medizinprodukte/ sterile Flächen/ desinfizierte Haut berühren.</p>
------------	---	--

332

332	<p>Wundverband an einer Extremität anlegen</p> <p>(Händedesinfektion eigener Baustein) (AF ist desinfiziert)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - keimarme Handschuhe - sterile Wundauflage, sterile Pinzette - Abmessung Mullbinde bzw. Schlauchverband - Rollenpflaster - Durchführung: Mullbinde Achtertouren
------------	--	--

420

420	Impfungen i.m. (Händedesinfektion eigener Baustein) (Arbeitsfläche ist desinfiziert)	<ul style="list-style-type: none"> - nach der Einnahme von Antikoagulanzen fragen - (Impfstoff aus dem Kühlschrank holen), Verfallsdatum aller Materialien überprüfen - Impfstoff (Fertigspritze) schwenken - patientenkonforme (Gewicht, Geschlecht, Alter) Kanüle auswählen, falls erforderlich - Hautdesinfektion - nach Trocknung senkrechter Einstich in den M. deltoideus (unteres Dreieck) des nicht dominanten Arms od. bei Säuglingen in d. anterolateralen Oberschenkel (z. B. Injektionspolster, Schwamm) - Injektion - Kanüle rasch entfernen - mit keimarmem Tupfer auf Injektionsstelle drücken, Pflaster (Pflasterallergie?) - Eintragung im Impfpass (mit Datum, Stempel, Unterschrift) - Chargennummer des Impfstoffes einkleben - Dokumentation in Patientendatei oder PC
------------	--	--

V43c

V43c	Formular – Rezept ohne Zusatz	<ul style="list-style-type: none"> - ankreuzen: gebührenfrei oder gebührenpflichtig - Stückzahl - Dosierungsanweisungen übernehmen bzw. Dj - entwerten - Stempel und Unterschrift - Status
-------------	-------------------------------	--

K38

K38	Verabschiedung verunsicherter Patient (positiv/negativ)	<ul style="list-style-type: none"> - Empathie zeigen (ansprechen, kümmern, Hilfe anbieten, Zeit nehmen, etc.) - ist der Patient mit allem versorgt? - hat der Patient alle Informationen? (z. B. neuer Termin) - Genesungswünsche (Glückwünsche, z. B. Schwangerschaft) - Gruß
------------	---	---

751

751	Dokumentation	<ul style="list-style-type: none"> - Datum - Diagnosen - Untersuchungen mit Ergebnis - therapeutische Maßnahmen - ausgestellte Formulare - Sonstiges Punktzahl fallabhängig
------------	---------------	---

750

750	Abrechnung	Falsche Ziffern ergeben keinen Punkt, zusätzliche Ziffern je ein P Abzug bis minimal 0P pro Tag
------------	------------	---